

水 稲

適期刈り取りと、適正な乾燥・調整で 胴割米をなくしましょう。

- ・刈取前の早期落水は、胴割・未熟粒等品質・収量の低下を招きます。概ね1週間前までの間断通水で、根の活力を維持しましょう。
- ・籾水分25%以下の圃場から刈り取りをして下さい。
高籾水分は乾燥ムラにより品質が低下します。
- ・早朝刈り取りはやめて、つゆが落ちてから刈り取りをして下さい。
コンバイン籾選別の低下により品質が低下します。
- ・農薬の使用基準（使用時期、収穫何日前まで）を厳守して収穫日を決定してください。

●倉前出荷生産者の方へ

- ・青線米は、1俵につき200円、価格が下がります。
乾燥調整は十分注意して14.5～15.0%の適正水分に調整して下さい。
- ・網下米は、専用袋を無償配布いたしますので、
全量JA出荷願います。
品種ごとに区分けして出荷をお願い致します。



● 熱中症に注意しましょう!

●カントリー・ライスセンター利用者の方へ

- ・乾燥作業をスムーズにするため、指定された日に
決められた面積の刈り取りをしてください。
乾燥時間が長くなると、食味・白度が低下します。
- ・刈り取り後は、すぐに施設へ持ち込んで下さい。(3時間以内)
速やかに乾燥をしないと品質低下がはじまります。
- ・倒伏した籾は受付で、必ず申し出て下さい。
施設全体の籾の品質が低下します。



● コンバイン作業は事前点検と安全確認を必ず実施しましょう!

一寸そら豆 100アールの産地を目指そう!

- 若狭の特産として、市場から生産拡大の要望があります。
面積拡大にご協力下さい。
- 一寸そら豆の栽培について
 - ① 収量・価格が安定しています。
 - ② 作業が比較的軽作業になります。
 - ③ 作業が水稻の端境期になるので、栽培しやすい品目です。



《一寸そら豆の作業体系》

月	9		10			11			12			1~2		3			4			5			6	
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		
作業内容	排水溝の整備	圃場準備	播種	定植	摘心				トンネル被覆			トンネル除去	整枝誘引①	親枝除去	誘引②		摘心誘引③			収穫開始				

種子のご注文は、最寄りの支店営農課、または、特産課へご連絡下さい。(7袋/10畝です。)